

MT11210 Hafaliadau Differol – Taflen Ymarfer 3 – Datrysiaidau

1a*) Mae datrysiaid cyffredinol $\frac{d^2y}{dx^2} + \frac{dy}{dx} - 12y = 24x^2$ ar ffurf

$$y(x) = \text{Ffwythiant Cyflenwol} + \text{Integryn Neilltuol}$$

I ddarganfod y Ffwythiant Cyflenwol, y_c , yn gyntaf rydym yn datrys yr hafaliad ategol:

$$m^2 + m - 12 = 0 \Rightarrow m_1 = -4, m_2 = 3.$$

Gan fod gwreiddiau yr hafaliad yn rhifau real gwahanadwy, y Ffwythiant Cyflenwol yw:

$$y_c = Ae^{-4x} + Be^{3x}.$$

Ile mae A a B yn gysonion mympwyol.

[3]

Gan fod y term fforsio yn fonomial o radd 2, rydym yn ceisio'r ffwythiant canlynol i bennu yr Integryn Neilltuol:

$$y_n(x) = a + bx + cx^2, \text{ fel bod } \frac{dy_n}{dx} = b + 2cx \text{ a } \frac{d^2y_n}{dx^2} = 2c.$$

Mae amnewid hwn i mewn i'r hafaliad differol yn peri:

$$\begin{aligned} 2c + (b + 2cx) - 12(a + bx + cx^2) &= 24x^2 \\ \Rightarrow -12a + b + 2c + (-12b + 2c)x - 12cx^2 &= 24x^2 \end{aligned}$$

Cymharu cyfernodau:

$$\begin{aligned} x^2) \quad -12c &= 24 & \Rightarrow c &= -2 \\ x) \quad -12b + 2c &= 0 & \Rightarrow b &= -\frac{1}{3} \\ 1) \quad -12a + b + 2c &= 0 & \Rightarrow a &= -\frac{13}{36} \end{aligned}$$

Felly, mae $-\frac{13}{36} - \frac{x}{3} - 2x^2$ yn Integryn Neilltuol, a'r datrysiaid cyffredinol yw

$$y(x) = Ae^{-4x} + Be^{3x} - 2x^2 - \frac{x}{3} - \frac{13}{36}$$

[3]

1b) Mae datrysiaid cyffredinol $\frac{d^2y}{dx^2} + 6\frac{dy}{dx} + 9y = 2e^{-x}$ ar ffurf

$$y(x) = \text{Ffwythiant Cyflenwol} + \text{Integryn Neilltuol}$$

I ddarganfod y Ffwythiant Cyflenwol, y_c , yn gyntaf rydym yn datrys yr hafaliad ategol:

$$m^2 + 6m + 9 = 0 \Rightarrow m_1 = m_2 = -3$$

Gan fod gwreiddiau yr hafaliad ategol yn hafal, y Ffwythiant Cyflenwol yw:

$$y_c = (A + Bx)e^{-3x}$$

Ile mae A a B yn gysonion mympwyol.

Gan fod y term fforsio yn ffwythiant esbonyddol, rydym yn ceisio'r ffwythiant canlynol i bennu yr Integryn Neilltuol:

$$y_n(x) = ae^{-x}, \text{ fel bod } \frac{dy_n}{dx} = -ae^{-x} \text{ a } \frac{d^2y_n}{dx^2} = ae^{-x}.$$

Mae amnewid hwn i mewn i'r hafaliad differol yn peri:

$$ae^{-x} - 6ae^{-x} + 9ae^{-x} = 2e^{-x} \\ \Rightarrow 4ae^{-x} = 2e^{-x}$$

Felly, $a = \frac{1}{2}$ ac mae $\frac{1}{2}e^{-x}$ yn Integryn Neilltuol. Felly, y datrysiad cyffredinol yw

$$y(x) = (A + Bx)e^{-3x} + \frac{1}{2}e^{-x}$$

1c*) Mae datrysiad cyffredinol $\frac{d^2y}{dx^2} + 4y = 10 \sin 3x$ ar ffurf

$$y(x) = \text{Ffwythiant Cyflenwol} + \text{Integryn Neilltuol}$$

I ddarganfod y Ffwythiant Cyflenwol, y_c , yn gyntaf rydym yn datrys yr hafaliad ategol:

$$m^2 + 4 = 0 \Rightarrow m_1 = -2i, m_2 = 2i$$

Gan fod y gwreiddiau yn gyfiau cymhlyg, y Ffwythiant Cyflenwol yw:

$$y_c = A \cos 2x + B \sin 2x$$

Ile mae A a B yn gysonion mympwyol.

[2]

Gan fod y term fforsio yn ffwythiant trigonometrig, rydym yn ceisio'r ffwythiant canlynol i bennu yr Integryn Neilltuol: $y_n(x) = a \cos 3x + b \sin 3x$, fel bod

$$\frac{dy_n}{dx} = -3a \sin 3x + 3b \cos 3x \text{ a } \frac{d^2y_n}{dx^2} = -9a \cos 3x - 9b \sin 3x.$$

Mae amnewid hwn i mewn i'r hafaliad differol yn peri:

$$-9a \cos 3x - 9b \sin 3x + 4(a \cos 3x + b \sin 3x) = 10 \sin 3x \\ \Rightarrow -5a \cos 3x - 5b \sin 3x = 10 \sin 3x$$

Cymharu cyfernodau:

$$\begin{array}{l} \cos 3x) \quad -5a = 0 \quad \Rightarrow \quad a = 0 \\ \sin 3x) \quad -5b = 10 \quad \Rightarrow \quad b = -2 \end{array}$$

Felly, mae $-2 \sin 3x$ yn Integryn Neilltuol, a'r datrysiad cyffredinol yw

$$y(x) = A \cos 2x + B \sin 2x - 2 \sin 3x$$

[3]

1d) Mae datrysiaid cyffredinol $\frac{d^2y}{dx^2} + 9y = 9 \sin 3x$ ar ffurf

$$y(x) = \text{Ffwythiant Cyflenwol} + \text{Integryn Neilltuol}$$

I ddarganfod y Ffwythiant Cyflenwol, y_c , yn gyntaf rydym yn datrys yr hafaliad ategol:

$$m^2 + 9 = 0 \Rightarrow m_1 = -3i, m_2 = 3i$$

Gan fod y gwreiddiau yn gyfiau cymhlyg, y Ffwythiant Cyflenwol yw:

$$y_c = A \cos 3x + B \sin 3x$$

Ile mae A a B yn gysonion mympwyol.

Gan fod y ffwythiant rhagbrofol arferol ($a \cos 3x + b \sin 3x$) sy'n cyfateb i'r term fforsio yn gallu cael ei ddiddwytho o'r Ffwythiant Cyflenwol (trwy roi $A = a$ a $B = b$), rydym yn ceisio'r ffwythiant canlynol i bennu'r Integryn Neilltuol: $y_n(x) = x(a \cos 3x + b \sin 3x)$, fel bod

$$\frac{dy_n}{dx} = (a + 3bx) \cos 3x + (b - 3ax) \sin 3x \quad \text{a} \quad \frac{d^2y_n}{dx^2} = (6b - 9ax) \cos 3x - (6a + 9bx) \sin 3x.$$

Mae amnewid hwn i mewn i'r hafaliad differol yn peri:

$$\begin{aligned} (6b - 9ax) \cos 3x - (6a + 9bx) \sin 3x + 9(ax \cos 3x + bx \sin 3x) &= 9 \sin 3x \\ \Rightarrow 6b \cos 3x - 6a \sin 3x &= 9 \sin 3x \end{aligned}$$

Cymharu cyfernodau:

$$\begin{aligned} \cos 3x) \quad 6b &= 0 \quad \Rightarrow \quad b = 0 \\ \sin 3x) \quad -6a &= 9 \quad \Rightarrow \quad a = -\frac{3}{2} \end{aligned}$$

Felly, mae $-\frac{3}{2}x \cos 3x$ yn Integryn Neilltuol, a'r datrysiaid cyffredinol yw

$$y(x) = A \cos 3x + B \sin 3x - \frac{3}{2}x \cos 3x$$

1e*) Mae datrysiaid cyffredinol $\frac{d^2y}{dx^2} - 6\frac{dy}{dx} + 9y = 10e^{3x}$ ar ffurf

$$y(x) = \text{Ffwythiant Cyflenwol} + \text{Integryn Neilltuol}.$$

I ddarganfod y Ffwythiant Cyflenwol, y_c , yn gyntaf rydym yn datrys yr hafaliad ategol:

$$m^2 - 6m + 9 = 0 \Rightarrow m_1 = m_2 = 3.$$

Gan fod gwreiddiau'r hafaliad ategol yn hafal, y Ffwythiant Cyflenwol yw:

$$y_c = (A + Bx)e^{3x}$$

Ile mae A a B yn gysonion mympwyol.

[3]

Gan fod y ffwythiant rhagbrofol arferol (ae^{3x}) sy'n cyfateb i'r term fforsio yn gallu cael ei ddiddwytho o'r Ffwythiant Cyflenwol (trwy roi $A = a$ a $B = 0$) (NB: mae xe^x yn gallu cael ei

ddiddwytho o'r Ffwythiant Cyflenwol hefyd), rydym yn ceisio'r ffwythiant canlynol i bennu'r Integryn Neilltuol: $y_n(x) = ax^2e^{3x}$, fel bod

$$\frac{dy_n}{dx} = ae^{3x}(3x^2 + 2x) \text{ a } \frac{d^2y_n}{dx^2} = ae^{3x}(9x^2 + 12x + 2).$$

Mae amnewid hwn i mewn i'r hafaliad differol yn peri:

$$\begin{aligned} ae^{3x}(9x^2 + 12x + 2 - 18x^2 - 12x + 9x^2) &= 10e^{3x} \\ \Rightarrow 2ae^{3x} &= 10e^{3x} \end{aligned}$$

Felly, $a = 5$ ac mae $5x^2e^{3x}$ yn Integryn Neilltuol. Felly, y datrysiad cyffredinol yw

$$y(x) = (A + Bx)e^{3x} + 5x^2e^{3x}$$

[5]

2a) Yn gyntaf rydym yn darganfod datrysiad cyffredinol $y'' + 5y' + 6y = 30 \cos t$, sydd ar ffurf

$$y(t) = \text{Ffwythiant Cyflenwol} + \text{Integryn Neilltuol}$$

I ddarganfod y Ffwythiant Cyflenwol, y_c , yn gyntaf rydym yn datrys yr hafaliad ategol:

$$m^2 + 5m + 6 = 0 \quad \Rightarrow \quad m_1 = -3, \quad m_2 = -2$$

Gan fod y gwreiddiau yn real ac yn wahanol, y Ffwythiant Cyflenwol yw:

$$y_c = Ae^{-3t} + Be^{-2t}$$

Ile mae A a B yn gysonion mympwyol.

Gan fod y term fforsio yn lluosrif o ffwythiant trigonometrig, rydym yn ceisio'r ffwythiant canlynol i bennu'r Integryn Neilltuol: $y_n(t) = a \cos t + b \sin t$, fel bod

$$y'_n(t) = -a \sin t + b \cos t \text{ a } y''_n(t) = -a \cos t - b \sin t$$

ar gyfer rhyw gysonion a a b i'w pennu. Mae amnewid hwn i mewn i'r hafaliad differol yn peri:

$$\begin{aligned} -a \cos t - b \sin t + 5(-a \sin t + b \cos t) + 6(a \cos t + b \sin t) &= 30 \cos t \\ \Rightarrow (5a + 5b) \cos t + (5b - 5a) \sin t &= 30 \cos t \end{aligned}$$

Cymharu cyfernodau:

$$\begin{aligned} \cos t) \quad 5a + 5b &= 30 \\ \sin t) \quad 5b - 5a &= 0 \end{aligned}$$

Mae datrys yr hafaliadau gydamserol yma yn peri $a = 3$ a $b = 3$. Felly, mae $3 \cos t + 3 \sin t$ yn Integryn Neilltuol a'r datrysiad cyffredinol yw

$$y(t) = Ae^{-3t} + Be^{-2t} + 3 \cos t + 3 \sin t$$

Fel ein bod yn gallu defnyddio'r amod cychwynnol $y'(0) = -1$, mae'n rhaid inni ddifferu'r datrysiad cyffredinol yn gyntaf i gael:

$$y'(t) = -3Ae^{-3t} - 2Be^{-2t} - 3 \sin t + 3 \cos t.$$

Felly, trwy ddefnyddio'r amodau cychwynnol rydym yn gweld bod

$$\begin{aligned} 4 &= y(0) = A + B + 3 \Rightarrow A + B = 1 \\ -1 &= y'(0) = -3A - 2B + 3 \Rightarrow 3A + 2B = 4 \end{aligned}$$

Mae datrys yr hafaliadau cydamserol uchod yn peri $A = 2$ a $B = -1$. Felly'r datrysiad penodol yw

$$y(t) = 2e^{-3t} - e^{-2t} + 3 \cos t + 3 \sin t$$

2b*) Yn gyntaf rydym yn darganfod datrysiad cyffredinol $y'' - 2y' + 2y = 2t + 5e^{-t}$, sydd ar ffurf

$$y(t) = \text{Ffwythiant Cyflenwol} + \text{Integryn Neilltuol}$$

I ddarganfod y Ffwythiant Cyflenwol, y_c , yn gyntaf rydym yn datrys yr hafaliad ategol:

$$m^2 - 2m + 2 = 0 \Rightarrow m_1 = 1 - i, m_2 = 1 + i$$

Gan fod y gwreiddiau yn gyfiau cymhlyg, y Ffwythiant Cyflenwol yw:

$$y_c = e^t(A \cos t + B \sin t)$$

Ile mae A a B yn gysonion mympwyol.

[2]

Gan fod y term fforsio yn swm o fonomial o radd 1 a llusorif o ffwythiant esbonyddol, rydym yn ceisio'r ffwythiant canlynol i ddarganfod yr Integryn Neilltuol:

$$y_n(t) = a + bt + ce^{-t}, \text{ fel bod } y'_n(t) = b - ce^{-t} \text{ a } y''_n(t) = ce^{-t}$$

ar gyfer rhyw gysonion a a b i'w pennu. Mae amnewid hwn i mewn i'r hafaliad differol yn peri:

$$\begin{aligned} ce^{-t} - 2(b - ce^{-t}) + 2(a + bt + ce^{-t}) &= 2t + 5e^{-t} \\ \Rightarrow 2a - 2b + 2bt + 5ce^{-t} &= 2t + 5e^{-t} \end{aligned}$$

Cymharu cyfernodau:

$$\begin{aligned} e^{-t}) \quad 5c &= 5 & \Rightarrow c &= 1 \\ t) \quad 2b &= 2 & \Rightarrow b &= 1 \\ 1) \quad 2a - 2b &= 0 & \Rightarrow a &= 1 \end{aligned}$$

Felly, mae $1 + t + e^{-t}$ yn Integryn Neilltuol, a'r datrysiad cyffredinol yw

$$y(t) = e^t(A \cos t + B \sin t) + 1 + t + e^{-t}$$

Fel ein bod yn gallu defnyddio'r amod cychwynnol $y'(0) = -1$, mae'n rhaid inni ddifferu'r datrysiad cyffredinol yn gyntaf i gael:

$$y'(t) = e^t((A + B) \cos t + (B - A) \sin t) + 1 - e^{-t}.$$

Felly, trwy ddefnyddio'r amodau cychwynnol rydym yn gweld bod

$$\begin{aligned} 0 &= y(0) = A + 2 \Rightarrow A = -2 \\ -1 &= y'(0) = A + B \Rightarrow B = 1 \end{aligned}$$

Felly, y datrysiad penodol yw

$$y(t) = e^t(\sin t - 2 \cos t) + 1 + t + e^{-t}$$

[4]

2c) Yn gyntaf rydym yn darganfod datrysiad cyffredinol $y'' + 4y = 10e^t - 4 \cos 2t$, sydd ar ffurf

$$y(t) = \text{Ffwythiant Cyflenwol} + \text{Integryn Neilltuol}$$

I ddarganfod y Ffwythiant Cyflenwol, y_c , yn gyntaf rydym yn datrys yr hafaliad ategol:

$$m^2 + 4 = 0 \Rightarrow m_1 = -2i, m_2 = 2i$$

Gan fod y gwreiddiau yn gyfiau cymhlyg, y Ffwythiant Cyflenwol yw:

$$y_c = A \cos 2t + B \sin 2t$$

Ile mae A a B yn gysonion mympwyol.

Gan fod y ffwythiant rhagbrofol arferol ($a \cos 2t + b \sin 2t$) sy'n cyfateb i ran o'r term fforsio yn gallu cael ei ddiddwytho o'r Ffwythiant Cyflenwol, rydym yn ceisio'r ffwythiant treial canlynol i bennu'r Integryn Neilltuol:

$$y_n(t) = at \cos 2t + bt \sin 2t + ce^t, \text{ fel bod}$$

$y'_n(t) = (a+2bt) \cos 2t + (b-2at) \sin 2t + ce^t$ a $y''_n(t) = (4b-4at) \cos 2t - (4a+4bt) \sin 2t + ce^t$ ar gyfer rhyw gysonion a a b i'w pennu. Mae amnewid hwn i mewn i'r hafaliad differol yn peri:

$$\begin{aligned} (4b - 4at) \cos 2t - (4a + 4bt) \sin 2t + ce^t + 4(at \cos 2t + bt \sin 2t + ce^t) &= 10e^t - 4 \cos 2t \\ \Rightarrow 4b \cos 2t - 4a \sin 2t + 5ce^t &= 10e^t - 4 \cos 2t \end{aligned}$$

Cymharu cyfernodau:

$$\begin{aligned} \sin 2t) \quad -4a &= 0 \Rightarrow a = 0 \\ \cos 2t) \quad 4b &= -4 \Rightarrow b = -1 \\ e^t) \quad 5c &= 10 \Rightarrow c = 2 \end{aligned}$$

Felly, mae $-t \sin 2t + 2e^t$ yn Integryn Neilltuol, a'r datrysiad cyffredinol yw

$$y(t) = A \cos 2t + B \sin 2t - t \sin 2t + 2e^t$$

Fel ein bod yn gallu defnyddio'r amod cychwynnol $y'(0) = 6$, mae'n rhaid inni ddifferu'r datrysiad cyffredinol yn gyntaf i gael:

$$y'(t) = (2B - 2t) \cos 2t - (2A + 1) \sin 2t + 2e^t.$$

Felly, trwy ddefnyddio'r amodau cychwynnol rydym yn gweld bod

$$\begin{aligned}5 &= y(0) = A + 2 \Rightarrow A = 3 \\6 &= y'(0) = 2B + 2 \Rightarrow B = 2\end{aligned}$$

Felly, y datrysiad penodol yw

$$y(t) = 3 \cos 2t + 2 \sin 2t - t \sin 2t + 2e^t$$

2d*) Yn gyntaf rydym yn darganfod datrysiad cyffredinol $y'' + 4y' + 4y = 10 + 8t - 6te^{-2t}$, sydd ar ffurf

$$y(t) = \text{Ffwythiant Cyflenwol} + \text{Integryn Neilltuol}$$

I ddarganfod y Ffwythiant Cyflenwol, y_c , yn gyntaf rydym yn datrys yr hafaliad ategol:

$$m^2 + 4m + 4 = 0 \Rightarrow m_1 = m_2 = -2$$

Gan fod gwreiddiau'r hafaliad ategol yn hafal, y Ffwythiant Cyflenwol yw:

$$y_c = (A + Bt)e^{-2t}$$

Ile mae A a B yn gysonion mympwyol.

[3]

Gan fod y ffwythiant rhagbrofol arferol $((c + dt)e^{-2t})$ sy'n cyfateb i ran o'r term fforsio yn gallu cael ei ddiddwytho o'r Ffwythiant Cyflenwol (trwy roi $A = c$ a $B = d$), rydym yn ceisio'r ffwythiant treial canlynol i bennu'r Integryn Neilltuol:

$$\begin{aligned}y_n(t) &= a + bt + t^2(c + dt)e^{-2t}, \text{ fel bod } y'_n(t) = b + (2ct + (3d - 2c)t^2 - 2dt^3)e^{-2t}, \\y''_n(t) &= (2c + (6d - 8c)t + (4c - 12d)t^2 + 4dt^3)e^{-2t}\end{aligned}$$

ar gyfer rhyw gysonion a , b , c a d i'w pennu. Mae amnewid hwn i mewn i'r hafaliad differol yn peri:

$$\begin{aligned}(2c + (6d - 8c)t + (4c - 12d)t^2 + 4dt^3)e^{-2t} + 4(b + (2ct + (3d - 2c)t^2 - 2dt^3)e^{-2t}) \\+ 4(a + bt + t^2(c + dt)e^{-2t}) = 10 + 8t - 6te^{-2t} \\ \Rightarrow 4a + 4b + 4bt + (2c + 6dt)e^{-2t} = 10 + 8t - 6te^{-2t}\end{aligned}$$

Cymharu cyfernodau:

$$\begin{aligned}e^{-2t}) \quad 2c = 0 &\Rightarrow c = 0 \\te^{-2t}) \quad 6d = -6 &\Rightarrow d = -1 \\t) \quad 4b = 8 &\Rightarrow b = 2 \\1) \quad 4a + 4b = 10 &\Rightarrow a = \frac{1}{2}\end{aligned}$$

Felly, mae $\frac{1}{2} + 2t - t^3e^{-2t}$ yn Integryn Neilltuol, a'r datrysiad cyffredinol yw

$$y(t) = (A + Bt - t^3)e^{-2t} + \frac{1}{2} + 2t$$

Fel ein bod yn gallu defnyddio'r amod cychwynnol $y'(0) = 1$, mae'n rhaid inni ddifferu'r datrysiad cyffredinol yn gyntaf i gael:

$$y'(t) = (B - 2A - 2Bt - 3t^2 + 2t^3)e^{-2t} + 2.$$

Felly, trwy ddefnyddio'r amodau cychwynnol rydym yn gweld bod

$$\begin{aligned} 2 &= y(0) = A + \frac{1}{2} \Rightarrow A = \frac{3}{2} \\ 1 &= y'(0) = B - 2A + 2 \Rightarrow B = 2 \end{aligned}$$

Felly, y datrysiad penodol yw

$$y(t) = \left(\frac{3}{2} + 2t - t^3 \right) e^{-2t} + \frac{1}{2} + 2t$$

[5]

3) Mae datrysiad cyffredinol $\frac{d^3y}{dx^3} + \frac{d^2y}{dx^2} + 4\frac{dy}{dx} + 4y = 10 \sin 3x - 5e^{-x}$ ar ffurf

$$y(x) = \text{Ffwythiant Cyflenwol} + \text{Integryn Neilltuol}$$

I ddarganfod y Ffwythiant Cyflenwol, y_c , yn gyntaf rydym yn datrys yr hafaliad ategol:

$$\begin{aligned} m^3 + m^2 + 4m + 4 = 0 &\Rightarrow m^2(m+1) + 4(m+1) = 0 \Rightarrow (m+1)(m^2+4) = 0 \\ &\Rightarrow m_1 = -1, m_2 = -2i, m_3 = 2i \end{aligned}$$

Gan fod yna un gwraidd real a phâr o wreiddiau cyfiau cymhlyg, y Ffwythiant Cyflenwol yw:

$$y_c = Ae^{-x} + B \cos 2x + C \sin 2x$$

Ile mae A , B a C yn gysonion mympwyol.

Gan fod y ffwythiant rhagbrofol arferol (ae^{-x}) sy'n cyfateb i'r rhan o'r term fforsio ($5e^{-x}$) yn gallu cael ei ddiddwytho o'r Ffwythiant Cyflenwol (trwy roi $A = a$), rydym yn ceisio'r ffwythiant canlynol i ddarganfod yr Integryn Neilltuol:

$$\begin{aligned} y_n(x) &= axe^{-x} + b \cos 3x + c \sin 3x, \text{ fel bod} \\ y'_n(x) &= ae^{-x}(-x+1) - 3b \sin 3x + 3c \cos 3x, \\ y''_n(x) &= ae^{-x}(x-2) - 9b \cos 3x - 9c \sin 3x \\ y'''_n(x) &= ae^{-x}(-x+3) + 27b \sin 3x - 27c \cos 3x \end{aligned}$$

Mae amnewid hwn i mewn i'r hafaliad differol yn peri:

$$\begin{aligned} ae^{-x}(-x+3) + 27b \sin 3x - 27c \cos 3x + ae^{-x}(x-2) - 9b \cos 3x - 9c \sin 3x \\ + 4(ae^{-x}(-x+1) - 3b \sin 3x + 3c \cos 3x) + 4(axe^{-x} + b \cos 3x + c \sin 3x) &= 10 \sin 3x - 5e^{-x} \\ \Rightarrow 5ae^{-x} - (15c + 5b) \cos 3x + (15b - 5c) \sin 3x &= 10 \sin 3x - 5e^{-x} \end{aligned}$$

Cymharu cyfernodau:

$$\begin{array}{l} e^{-x}) \quad 5a = -5 \quad \Rightarrow \quad a = -1 \\ \cos 3x) \quad -15c - 5b = 0 \quad \Rightarrow \quad b = -3c \\ \sin 3x) \quad 15b - 5c = 10 \quad \Rightarrow \quad c = -\frac{1}{5} \Rightarrow b = \frac{3}{5} \end{array}$$

Felly, mae $-xe^{-x} + \frac{3}{5} \cos 3x - \frac{1}{5} \sin 3x$ yn Integryn Neilltuol, a'r datrysiad cyffredinol yw

$$y(x) = (A - x)e^{-x} + B \cos 2x + C \sin 2x + \frac{3}{5} \cos 3x - \frac{1}{5} \sin 3x$$

4*) Yn gyntaf rydym yn darganfod datrysiad cyffredinol $y^{(iv)} - 4y'' = 8e^{2x} + 24x$, sydd ar ffurf

$$y(x) = \text{Ffwythiant Cyflenwol} + \text{Integryn Neilltuol}$$

I ddarganfod y Ffwythiant Cyflenwol, y_c , yn gyntaf rydym yn datrys yr hafaliad ategol:

$$m^4 - 4m^2 = 0 \Rightarrow m^2(m^2 - 4) = 0 \Rightarrow m_1 = m_2 = 0, m_3 = -2, m_4 = 2$$

Gan fod yna un gwraidd wedi ei ail-adrodd ddwywaith a phâr o wreiddiau real gwahanol, y Ffwythiant Cyflenwol yw:

$$y_c = A + Bx + Ce^{2x} + De^{-2x}$$

Ile mae A , B , C a D yn gysonion mympwyol.

Gan fod y ffwythiant rhagbrofol arferol ($ae^{2x} + b + cx$) sy'n cyfateb i'r term fforsio yn gallu cael ei ddiddwytho o'r Ffwythiant Cyflenwol (trwy roi $C = a$, $A = b$ a $B = c$), rydym yn ceisio'r ffwythiant canlynol i ddarganfod yr Integryn Neilltuol:

$$\begin{aligned} y_n(x) &= axe^{2x} + x^2(b + cx), \\ y'_n(x) &= ae^{2x}(2x + 1) + 2bx + 3cx^2, \\ y''_n(x) &= ae^{2x}(4x + 4) + 2b + 6cx \\ y'''_n(x) &= 4ae^{2x}(2x + 3) + 6c \\ y^{(iv)}_n(x) &= 16ae^{2x}(x + 2) \end{aligned}$$

Mae amnewid hwn i mewn i'r hafaliad differol yn peri:

$$\begin{aligned} 16ae^{2x}(x + 2) - 4(ae^{2x}(4x + 4) + 2b + 6cx) &= 8e^{2x} + 24x \\ \Rightarrow 16ae^{2x} - 8b - 24cx &= 8e^{2x} + 24x \end{aligned}$$

Cymharu cyfernodau:

$$\begin{array}{l} e^{2x}) \quad 16a = 8 \quad \Rightarrow \quad a = \frac{1}{2} \\ 1) \quad -8b = 0 \quad \Rightarrow \quad b = 0 \\ x) \quad -24c = 24 \quad \Rightarrow \quad c = -1 \end{array}$$

Felly, mae $\frac{1}{2}xe^{2x} - x^3$ yn Integryn Neilltuol, a'r datrysiad cyffredinol yw

$$y(x) = A + Bx + Ce^{2x} + De^{-2x} + \frac{1}{2}xe^{2x} - x^3$$

Fel ein bod yn gallu defnyddio'r amod cychwynnol, mae'n rhaid inni ddifferu'r datrysiad cyffredinol yn gyntaf i gael:

$$\begin{aligned}y'(x) &= B + 2Ce^{2x} - 2De^{-2x} + \frac{1}{2}e^{2x}(2x + 1) - 3x^2 \\y''(x) &= 4Ce^{2x} + 4De^{-2x} + 2e^{2x}(x + 1) - 6x \\y'''(x) &= 8Ce^{2x} - 8De^{-2x} + 2e^{2x}(2x + 3) - 6\end{aligned}$$

Felly, trwy ddefnyddio'r amodau cychwynnol rydym yn gweld bod

$$\begin{aligned}3 &= y(0) = A + C + D \\1 &= y'(0) = B + 2C - 2D + \frac{1}{2} \\2 &= y''(0) = 4C + 4D + 2 \\-2 &= y'''(0) = 8C - 8D + 6 - 6\end{aligned}$$

Mae datrys y system o hafaliadau uchod ar gyfer A , B , C a D yn peri bod $A = 3$, $B = 1$, $C = -\frac{1}{8}$, $D = \frac{1}{8}$. Felly, y datrysiad yw

$$y(x) = 3 + x - x^3 + \frac{1}{8}(4x - 1)e^{2x} + \frac{1}{8}e^{-2x}$$

[7]